

ANTIDEMENCIALES

	Inhibidores de la acetilcolinesterasa			Antagonista del receptor NMDA **
	donepezilo	rivastigmina	galantamina	memantina
ETAPA INDICADA	Todas las etapas de la demencia.	*** Leve a moderado	Leve a moderada	Moderado a severo

Hay evidencia de **calidad moderada para el tratamiento con Donepezilo para demencia leve, moderada o grave** debido a la enfermedad de Alzheimer.

Tratamiento **3 a 6 meses** con donepezilo experimentan beneficios **pequeños** en la función cognitiva, las actividades cotidianas y el estado clínico global.

Antidemenciales



Donepecilo

Indicación: Demencia tipo Alzheimer **leve a moderada**

Posología	Inicio: una toma diaria de 5mg con la cena. Al mes se debería aumentar a 10mg de acuerdo a la tolerancia y efectos adversos



Memantina

Indicación: Demencia tipo Alzheimer **moderada a severa**

Posología	Dosis	Desayuno	Cena
Semana 1	10 mg	1/2	-
Semana 2	10 mg	1/2	1/2
Semana 3	10 mg	1	1/2
Semana 4	10 mg	1	1
	o 20 mg	1	-

Antidemenciales

- Mejoría modesta de síntomas conductuales (y cognitivos)
- No todos los pacientes responden (50%)
- Suelen ser bien tolerados
- La mejoría puede ser sutil y gradual
- Se podría iniciar un inhibidor de la colinesterasa para pacientes con síntomas neuropsiquiátricos y demencia leve a moderada por Enf. de Alzheimer.

Efectos adversos más comunes

- ★ **DONEPEZILO:** se suele indicar por la noche, pero si da sueños vívidos o pesadillas se podría indicar por la mañana.

Las náuseas, diarrea y anorexia se presentan en el 20 al 30%, aunque mejor tolerados que los otros dos medicamentos.

- ★ **GALANTAMINA:** más comunes los efectos adversos gastrointestinales.
- ★ **RIVASTIGMINA:** puede causar irritación local, se debe rotar el sitio de aplicación. Si se administra vía oral debe hacerse con alimentos por efectos adversos gastrointestinales.
- ★ **MEMANTINE:** mareos, somnolencia, alteración función hepática

Todos pueden provocar anorexia y pérdida de peso

Debe interrumpirse en hipotensión y/o bradicardia sintomática sin otra causa.

¿Cuándo suspender antidepresivos?

- No hay claro consenso en pacientes que toleran la medicación
 - Si no hay respuesta luego de 6 meses de tratamiento
 - Efectos adversos intolerables
 - Demencia ya en fase muy avanzada
-
- La suspensión debe ser paulatina.