

|                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campylobacter                                | Hasta 24 hs post síntomas                                                                             |
| Citomegalovirus                              | El período sintomático                                                                                |
| Conjuntivitis                                | Hasta que termine la secreción.<br>48 hs si ya inició tratamiento antibiótico.                        |
| Covid 19                                     | 5 días desde el inicio de síntomas y más de 24 horas sin fiebre.                                      |
| Dengue                                       | Hasta 48 hs de superados los síntomas                                                                 |
| Escherichia Coli productora de shiga toxina  | Hasta 48 hs post síntomas y 2 coprocultivos negativos separados por 48 hs                             |
| Eritema infeccioso - quinta enfermedad       | Solo el período febril                                                                                |
| Escarlatina                                  | 48 hs si ya inició tratamiento antibiótico.                                                           |
| Exantema súbito - sexta enfermedad - roseola | Solo el período febril                                                                                |
| Faringitis/amigdalitis                       | 48 hs si ya inició tratamiento antibiótico.                                                           |
| Gastroenteritis inespecífica                 | Hasta 24 hs post síntomas                                                                             |
| Giardiasis                                   | Hasta 24 hs post síntomas. No excluir a portador asintomático.                                        |
| Gingivitis/estomatitis                       | No indicado en herpes labial. Solo en primoinfección herpética en niños que no controlan secreciones. |
| Gripe                                        | 24 hs de la disminución de secreciones                                                                |
| Hepatitis A                                  | 7 días de inicio de los síntomas o ictericia                                                          |
| Hepatitis B                                  | No                                                                                                    |
| Hepatitis C                                  | No                                                                                                    |
| Impétigo                                     | Curación de las lesiones o 48 hs de inicio de antibióticos                                            |
| Mano-pie-boca                                | Hasta que las vesículas sean costra                                                                   |
| Meningitis/sepsis                            | Erradicación del germen                                                                               |
| Moluscos                                     | No (cubrir, evitar compartir)                                                                         |
| Mononucleosis por Epstein Barr               | No                                                                                                    |
| Oxiuriasis                                   | No                                                                                                    |
| Parotiditis                                  | 5 días desde el inicio de síntomas                                                                    |
| Pediculosis cabeza                           | No                                                                                                    |
| Pitiriasis versicolor                        | No                                                                                                    |
| Rubeola                                      | 7 días desde el inicio de exantema                                                                    |
| Salmonellosis                                | Hasta 24 hs post síntomas                                                                             |
| Sarampión                                    | 4 días desde el inicio de exantema                                                                    |
| Sarna                                        | Hasta completar tratamiento                                                                           |
| Shigelosis                                   | <5 años, hasta dos copro negativos separados x 48 horas.<br>>5 años hasta 24 hs post síntomas         |
| Tiña corporis                                | No                                                                                                    |
| Tiña cuero cabelludo                         | 48 hs post inicio tratamiento                                                                         |
| Tiña pedis (pie de atleta)                   | No, no usar piletas hasta curación                                                                    |
| Tos convulsa                                 | 5 días de iniciado el tratamiento                                                                     |
| Tuberculosis pulmonar                        | Completar 2-4 semanas de tratamiento                                                                  |
| Varicela/zoster                              | Hasta que las lesiones sean costra. Varicela atenuada hasta que no aparezcan lesiones nuevas          |